

Transmuraal Formularium Astma & COPD

COPD

		Droog Poeder Inhalator (DPI)	Ademgestuurde Dosisaerosol (pMDI) en Soft Mist Inhaler (SMI)	Dosisaerosol (pMDI) met voorzetkamer
SABA	Medium 40/50-60L/min Medium high 35-60L/min	Medium low 30-60L/min	Low 20-60L/min	Low 20-60L/min
SAMA	Salbutamol novolizer zn 100 - max 800	Ventolin (Salbutamol) diskus zn 200 - max 800	Salbutamol redihaler zn 100 - max 800	Salbutamol dosisaerosol zn 100 - max 800
LABA	Formoterol novolizer 2dd 12 - max 48		Striverdi (Olodaterol) respimat 1dd 5mcg = max	Ipratropium dosisaerosol zn 20 - max 160
LAMA	Eklira (Aclidinium) genuair 2dd 322 = max	Incruse (Umeclidinium) ellipta 1dd 55 = max	Spiriva (Tiotropium) respimat 1dd 5mcg = max	Berodual dosisaerosol zn 20/50, max 8 inh
LAMA/LABA	Duaklir (Aclidinium/Formoterol) genuair 2dd 340/12 = max	Anoro (Umeclidinium/Vilanterol) ellipta 1dd 55/22 = max	Spiolto (Tiotropium/Olodaterol) respimat 1dd 5/5 mcg = max	Bevespi (Glycopyrronium/ Formoterol) 2dd 2 7.2mcg/5mcg
ICS/LABA	Foster (Beclometason/ Formoterol) nexthaler 2dd 100/6 - max 400/24	Relvar (Fluticasonfuroaat/ Vilanterol) ellipta 1dd 92/22 = max		Foster (Beclometason/ Formoterol) dosisaerosol 2dd 100/6 - max 400/24
ICS			Qvar (Beclometason) redihaler 2dd 400, max 1600	
ICS/LABA/LAMA	Trimbow (Beclometason/Formoterol/ Glycopyrronium) nexthaler 87/5/9 - 2dd 2inh = max	Trelegy (Fluticasonfuroaat/ Vilanterol/Umeclidinium) ellipta 1dd 92/55/22 = max		Trimbow (Beclometason/Formoterol/ Glycopyrronium) dosisaerosol 87/5/9 - 2dd 2inh = max

alleen na overleg longarts

Stappenplan inhalatiemedicatie (gebruik hiervoor het EVS)

Dyspneuklachten, hinder of beperkingen	Stap 1 Infrequente dyspneuklachten, geen longaanvallen	Stap 2 Regelmatige dyspneuklachten, hinder of beperkingen	Stap 3 Persistende dyspneuklach- ten, hinder of beperkingen
	SABA of SAMA, zo nodig	LAMA of LABA, onderhoud	LAMA + LABA, onderhoud
Longaanvallen, > 2 per jaar	Niet van toepassing	Voeg ICS toe* Start of continueer luchtwegverwijder	Voeg ICS toe. Bij voorkeur 1 luchtwegverwijder (overweeg de andere te staken). Overweeg verwijzing

* Als de patient verder weinig klachten heeft, volstaat een LAMA